肺癌登録ﾚｼﾞﾒﾝ一覧

No.	ﾚｼﾞﾒﾝ名
0031	Erlotinib+Bevacizumab triweekly
0032	ニボルマブ療法（肺癌）
0033	ニボルマブ療法monthly（肺癌）
0034	Ramucirumab + DTX triweekly
0035	ペムブロリズマブ　triweekly
0036	ペムブロリズマブ 6週間隔
0037	アテゾリズマブ　triweekly
0038	デュルバルマブ　biweekly
0039	NGT 単独療法
0040	CBDCA+PTX+Bev.+Atezo. Triweekly
0041	Atezolizumab+Bev.triweekly
0042	CDDP+PEM+pembrolizumab triweekly
0043	CBDCA+PEM+pembrolizumab triweekly
0044	PEM+pembrolizumab triweekly
0045	CBDCA+PTX+pembrolizumab triweekly
0046	CBDCA+Nab-PTX+pembrolizumab triweekly
0047	CBDCA+VP-16+Atezo. Triweekly
0048	CDDP+PEM+Atezo. triweekly
0049	CBDCA+PEM+Atezo. triweekly
0050	PEM+Atezo. triweekly
0051	CBDCA+nab-PTX+Atezo. Triweekly
0052	CDDP+VP-16+Durvalumab triweekly
0053	CBDCA+VP-16+Durvalumab triweekly
0054	Durvalumab monthly
0055	CBDCA+PEM+Osimertinib
0056	PEM+Osimertinib(維持療法)
0057	CDDP+PEM+ニボルマブ＋イピリムマブ

Erlotinib+Bevacizumab triweekly

対象疾患	肺癌
投与間隔	3週1コース

催吐リスク	最小度（催吐性）リスク

〇レジメン内容（※制吐薬（下記参照）等の内服薬が処方される事があります。）

番号	抗癌剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	投与日 1	2	3	・・・	21					
RP.1		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	15分	〇									
RP.2		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン		〇									
	〇	ベバシズマブ	15mg/kg	投与時間：初回90分,2回目60分,以後30分												
RP.3		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	15分	〇									
内服	〇内服	タルセバ	150mg	経口		1日1回	←――――――――→（1〜21）									
									内服							

ニボルマブ療法（肺癌）

対象疾患	肺癌、悪性胸膜中皮腫
投与間隔	2週1コース

催吐リスク	最小度（催吐性）リスク

〇レジメン内容（※制吐薬（下記参照）等の内服薬が処方される事があります。）

番号	抗癌剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	投与日									
							1	2	3	・・・	14					
RP.1		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	〇									
				インラインフィルター使用												
RP.2		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分	〇									
	〇	オプジーボ	240mg/body	30分以上かけて投与												
RP.3		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	〇									

ニボルマブ療法monthly（肺癌）

対象疾患	肺癌、悪性胸膜中皮腫
投与間隔	4週1コース

催吐リスク	最小度（催吐性）リスク

〇レジメン内容（※制吐薬（下記参照）等の内服薬が処方される事があります。）

番号	抗癌剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	投与日									
							1	2	3	・・・	28					
RP.1		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	〇									
				インラインフィルター使用												
RP.2		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分	〇									
	〇	オプジーボ	480mg/body	30分以上かけて投与												
RP.3		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	〇									

Ramucirumab + DTX triweekly

対象疾患	肺癌
投与間隔	3週1コース

催吐リスク	軽度（催吐性）リスク

〇レジメン内容（※制吐薬（下記参照）等の内服薬が処方される事があります。）

番号	抗癌剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	投与日									
							1	2	3	・・・	21					
RP.1		グラニセトロン	3mg	点滴静注	メイン	30分	〇									
		デキサート	6.6mg	インラインフィルター使用												
		ポララミン	5mg													
RP.2		生理食塩液	250mL	点滴静注	メイン		〇									
	〇	サイラムザ	10mg/kg	投与時間：初回60分、2回目以降、30分												
RP.3		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	60分	〇									
		（3回目以降生理食塩液50mL）		infusion reaction 観察期間（3回目以降投与速度全開可）												
RP.4		5%ブドウ糖液	250mL	点滴静注	メイン	60分	〇									
	〇	ドセタキセル	60mg/㎡	輸液ポンプ使用禁												
RP.5		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	〇									

ペムブロリズマブ　triweekly

対象疾患	肺癌
投与間隔	3週1コース

催吐リスク	最小度（催吐性）リスク

〇レジメン内容（※制吐薬（下記参照）等の内服薬が処方される事があります。）

番号	抗癌剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	投与日									
							1	2	3	・・・	21					
RP.1		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	30分	〇									
				インラインフィルター使用												
RP.2		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分	〇									
	〇	キイトルーダ	200mg/body	30分以上かけて投与												
RP.3		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	〇									

ペムブロリズマブ 6週間隔

対象疾患	肺癌
投与間隔	6週1コース

催吐リスク	最小度（催吐性）リスク

〇レジメン内容（※制吐薬（下記参照）等の内服薬が処方される事があります。）

番号	抗癌剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	投与日									
							1	2	3	・・・	42					
RP.1		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	30分	○									
				インラインフィルター使用												
RP.2		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分	○									
	○	キイトルーダ	400mg/body													
RP.3		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	○									

アテゾリズマブ　triweekly

対象疾患	肺癌
投与間隔	3週1コース

催吐リスク	最小度（催吐性）リスク

○レジメン内容（※制吐薬（下記参照）等の内服薬が処方される事があります。）

番号	抗癌剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	投与日									
							1	2	3	・・・	21					
RP.1		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	30分	○									
				インラインフィルター使用												
RP.2		生理食塩液	250mL	点滴静注	メイン		○									
	○	テセントリク	1200mg/body	点滴時間：初回60分,2回目以降30分												
RP.3		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	○									

デュルバルマブ　biweekly

対象疾患	肺癌
投与間隔	2週1コース

催吐リスク	最小度（催吐性）リスク

〇レジメン内容（※制吐薬（下記参照）等の内服薬が処方される事があります。）

番号	抗癌剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	投与日									
							1	2	3	・・・	14					
		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	30分	〇									
RP.1				インラインフィルター使用												
		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	60分	〇									
RP.2	〇	イミフィンジ	10mg/Kg	60分以上かけて投与												
		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	〇									
RP.3																

NGT 単独療法

対象疾患	肺癌
投与間隔	3週1コース

催吐リスク	中等度（催吐性）リスク

○レジメン内容（※制吐薬（下記参照）等の内服薬が処方される事があります。）

番号	抗癌剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	投与日									
							1	2	3	4	5	・・・	21			
RP.1		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	30分	○	○	○	○	○					
		デキサート	6.6mg													
RP.2		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分	○	○	○	○	○					
	○	ハイカムチン	1.5mg/㎡													
RP.3		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	○	○	○	○	○					

CBDCA+PTX+Bev.+Atezo. Triweekly

対象疾患	肺癌
投与間隔	3週1コース

催吐リスク	中等度（催吐性）リスク

○レジメン内容（※制吐薬（下記参照）等の内服薬が処方される事があります。）

番号	抗癌剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	投与日									
							1	2	3	・・・	21					
RP.1		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	30分	○									
				インラインフィルター使用												
RP.2		生理食塩液	250mL	点滴静注	メイン		○									
	○	テセントリク	1200mg/body	点滴時間：初回60分,2回目以降30分												
RP.3		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	○									
RP.4		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン		○									
	○	ベバシズマブ	15mg/kg	投与時間：初回90分,2回目60分,以後30分												
RP.5		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	15分	○									
		ファモチジン	20mg													
		デキサート	9.9mg													
		ポララミン	5mg													
RP.6		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	30分	○									
		パロノセトロン	0.75mg													
RP.7		5%ブドウ糖液	500mL	点滴静注	メイン	120分	○									
	○	パクリタキセル	200mg/㎡	輸液ポンプ使用禁												
RP.8		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	30分	○									
RP.9		5%ブドウ糖液	250mL	点滴静注	メイン	30分	○									
	○	カルボプラチン	AUC:6													
RP.10		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	○									

Atezolizuma+Bev.triweekly

対象疾患	肺癌
投与間隔	3週1コース

催吐リスク	最小度（催吐性）リスク

○レジメン内容（※制吐薬（下記参照）等の内服薬が処方される事があります。）

番号	抗癌剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	投与日									
							1	2	3	・・・	21					
RP.1		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	30分	○									
				インラインフィルター使用												
RP.2		生理食塩液	250mL	点滴静注	メイン		○									
	○	テセントリク	1200mg/body	点滴時間：初回60分,2回目以降30分												
RP.3		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	○									
RP.4		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分	○									
	○	ベバシズマブ	15mg/kg													
RP.5		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	○									

CDDP+PEM+pembrolizumab triweekly

対象疾患	肺癌
投与間隔	3週1コース

催吐リスク	高度（催吐性）リスク

○レジメン内容（※制吐薬（下記参照）等の内服薬が処方される事があります。）

番号	抗癌剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	投与日									
							1	2	3	・・・	21					
RP.1		ソルデム3A	3000mL	点滴静注	メイン	指定なし	○									
				80mL/h インラインフィルター使用												
RP.2		ソルラクトD	500mL	点滴静注	側管	120分	○									
		デキサート	9.9mg													
RP.3		生理食塩液	50mL	点滴静注	側管	10分	○									
		パロノセトロン	0.75mg													
RP.4		生理食塩液	100mL	点滴静注	側管	30分	○									
	○	キイトルーダ	200mg/body													
RP.5		生理食塩液	100mL	点滴静注	側管	10分	○									
	○	ペメトレキセド	500mg/㎡													
RP.6		生理食塩液	100mL	点滴静注	側管	30分	○									
RP.7		生理食塩液	500mL	点滴静注	側管	120分	○									
	○	シスプラチン	75mg/㎡													
RP.8		ソルラクトD	500mL	点滴静注	側管	120分	○									
		プリンペラン	20mg													
RP.9		ソルラクトD	500mL	点滴静注	側管	120分	○									
RP.10		ソルラクトD	500mL	点滴静注	側管	120分		○								
		プリンペラン	20mg													
RP.11		ソルラクトD	500mL	点滴静注	側管	120分		○								
		プリンペラン	20mg													

CBDCA+PEM+pembrolizumab triweekly

対象疾患	肺癌
投与間隔	3週1コース

催吐リスク	中等度（催吐性）リスク

〇レジメン内容（※制吐薬（下記参照）等の内服薬が処方される事があります。）

番号	抗癌剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	投与日									
							1	2	3	・・・	21					
RP.1		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分	〇									
		デキサート	3.3mg	インラインフィルター使用												
RP.2		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	〇									
		パロノセトロン	0.75mg													
RP.3		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分	〇									
	〇	キイトルーダ	200mg/body													
RP.4		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	10分	〇									
	〇	ペメトレキセド	500mg/㎡													
RP.5		5%ブドウ糖液	250mL	点滴静注	メイン	60分	〇									
	〇	カルボプラチン	AUC:5													
RP.6		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	全開	〇									

PEM+pembrolizumab triweekly

対象疾患	肺癌
投与間隔	3週1コース

催吐リスク	軽度（催吐性）リスク

○レジメン内容（※制吐薬（下記参照）等の内服薬が処方される事があります。）

番号	抗癌剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	投与日									
							1	2	3	・・・	21					
RP.1		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分	○									
		デキサート	6.6mg	インラインフィルター使用												
RP.2		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分	○									
	○	キイトルーダ	200mg/body													
RP.3		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	10分	○									
	○	ペメトレキセド	500mg/㎡													
RP.4		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	全開	○									

CBDCA+PTX+pembrolizumab triweekly

対象疾患	肺癌
投与間隔	3週1コース

催吐リスク	中等度(催吐性)リスク

○レジメン内容(※制吐薬(下記参照)等の内服薬が処方される事があります。)

番号	抗癌剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	投与日									
							1	2	3	・・・	21					
RP.1		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分	○									
		パロノセトロン	0.75mg													
		デキサート	9.9mg													
		ファモチジン	20mg	インラインフィルター使用			○									
		ポララミン	5mg													
RP.2		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分	○									
	○	キイトルーダ	200mg/body													
RP.3		5%ブドウ糖液	500mL	点滴静注	メイン	180分	○									
	○	パクリタキセル	200mg/㎡	輸液ポンプ使用禁												
RP.4		5%ブドウ糖液	250mL	点滴静注	メイン	60分	○									
	○	カルボプラチン	AUC:6													
RP.5		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン		○									

CBDCA+Nab-PTX+pembrolizumab triweekly

対象疾患	肺癌
投与間隔	3週1コース

催吐リスク	中等度（催吐性）リスク

○レジメン内容（※制吐薬（下記参照）等の内服薬が処方される事があります。）

番号	抗癌剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	投与日									
							1	・・・	8	・・・	15	・・・	21			
RP.1		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	15分	○									
		パロノセトロン	0.75mg	インラインフィルター使用												
		デキサート	3.3mg													
RP.2		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分	○									
	○	キイトルーダ	200mg/body													
RP.3		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	○									
RP.4		生理食塩液	50mL	点滴静注	側管	全開	○									
				フィルターより下の側管から投与												
RP.5		生理食塩液	50mL	点滴静注	側管	30分	○									
	○	アブラキサン	100mg/㎡	輸液ポンプ使用禁 インラインフィルター使用禁止												
RP.6		生理食塩液	50mL	点滴静注	側管	全開	○									
RP.7		5%ブドウ糖液	250mL	点滴静注	メイン	60分	○									
	○	カルボプラチン	AUC:6													
RP.8		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	○									
RP.9		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	30分			○		○					
RP.10		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	30分			○		○					
	○	アブラキサン	100mg/㎡	輸液ポンプ使用禁 インラインフィルター使用禁止												
RP.11		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開			○		○					

CBDCA+VP-16+Atezo. Triweekly

対象疾患	肺癌
投与間隔	3週1コース

催吐リスク	中等度（催吐性）リスク

○レジメン内容（※制吐薬（下記参照）等の内服薬が処方される事があります。）

番号	抗癌剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	投与日									
							1	2	3	・・・	21					
RP.1		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	30分	○									
				インラインフィルター使用												
RP.2		生理食塩液	250mL	点滴静注	メイン		○									
	○	テセントリク	1200mg/body	投与時間：初回60分、2回目以降30分												
RP.3		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分	○									
		パロノセトロン	0.75mg													
		デキサート	3.3mg													
RP.4		5%ブドウ糖液	250mL	点滴静注	メイン	60分	○									
	○	カルボプラチン	AUC:5													
RP.5		生理食塩液	500mL	点滴静注	メイン	60分	○									
	○	エトポシド	100mg/㎡	PVCフリーの輸液セットを使用												
RP.6		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	○									
RP.7		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分		○	○							
		デキサート	3.3mg													
RP.8		生理食塩液	500mL	点滴静注	メイン	60分		○	○							
	○	エトポシド	100mg/㎡	PVCフリーの輸液セットを使用												
RP.9		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開		○	○							

CDDP+PEM+Atezo. triweekly

対象疾患	肺癌
投与間隔	3週1コース

催吐リスク	高度（催吐性）リスク

○レジメン内容（※制吐薬（下記参照）等の内服薬が処方される事があります。）

番号	抗癌剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	投与日									
							1	2	3	・・・	21					
RP.1		ソルデム3A	3000mL	点滴静注	メイン	指定なし	○									
RP.2		ソルラクトD	500mL	点滴静注	側管	120分	○									
		デキサート	9.9mg	インラインフィルター使用												
RP.3		生理食塩液	50mL	点滴静注	側管	10分	○									
		パロノセトロン	0.75mg													
RP.4		生理食塩液	250mL	点滴静注	側管		○									
	○	テセントリク	1200mg/body	投与時間：初回60分,以後30分												
RP.5		生理食塩液	100mL	点滴静注	側管	10分	○									
	○	ペメトレキセド	500mg/㎡													
RP.6		生理食塩液	100mL	点滴静注	側管	30分	○									
RP.7		生理食塩液	500mL	点滴静注	側管	120分	○									
	○	シスプラチン	75mg/㎡													
RP.8		ソルラクトD	500mL	点滴静注	側管	120分	○									
		プリンペラン	20mg													
RP.9		ソルラクトD	500mL	点滴静注	側管	120分	○									
RP.10		ソルラクトD	500mL	点滴静注	側管	120分		○								
		プリンペラン	20mg													
RP.11		ソルラクトD	500mL	点滴静注	側管	120分		○								
		プリンペラン	20mg													

CBDCA+PEM+Atezo. triweekly

対象疾患	肺癌
投与間隔	3週1コース

催吐リスク	中等度（催吐性）リスク

〇レジメン内容（※制吐薬（下記参照）等の内服薬が処方される事があります。）

番号	抗癌剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	投与日									
							1	2	3	・・・	21					
RP.1		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分	〇									
		デキサート	3.3mg													
		パロノセトロン	0.75mg													
RP.2		生理食塩液	250mL	点滴静注	メイン		〇									
	〇	テセントリク	1200mg/body	投与時間：初回60分、2回目以降30分												
RP.3		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	10分	〇									
	〇	ペメトレキセド	500mg/㎡													
RP.4		5%ブドウ糖液	250mL	点滴静注	メイン	60分	〇									
	〇	カルボプラチン	AUC:6													
RP.5		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	〇									

PEM+Atezo. triweekly

対象疾患	肺癌
投与間隔	3週1コース

催吐リスク	軽度（催吐性）リスク

〇レジメン内容（※制吐薬（下記参照）等の内服薬が処方される事があります。）

番号	抗癌剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	投与日									
							1	2	3	・・・	21					
RP.1		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分	〇									
		デキサート	6.6mg													
RP.2		生理食塩液	250mL	点滴静注	メイン		〇									
	〇	テセントリク	1200mg/body	投与時間：初回60分、2回目以降30分												
RP.3		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	10分	〇									
	〇	ペメトレキセド	500mg/㎡													
RP.4		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	〇									

CBDCA+nab-PTX+Atezo. triweekly

対象疾患	肺癌
投与間隔	3週1コース

催吐リスク	中等度（催吐性）リスク

○レジメン内容（※制吐薬（下記参照）等の内服薬が処方される事があります。）

番号	抗癌剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	投与日 1	2	・・・	8	・・・	15	・・・	21		
RP.1		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	30分	○									
		パロノセトロン	0.75mg	インラインフィルター使用												
		デキサート	3.3mg													
RP.2		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	30分				○		○				
		デキサート	6.6mg													
RP.3		生理食塩液	250mL	点滴静注	メイン		○									
	○	テセントリク	1200mg/body	投与時間：初回60分、2回目以降30分												
RP.4		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	○									
RP.5		生理食塩液	50mL	点滴静注	側管	全開	○									
				フィルターより下の側管から投与												
RP.6		生理食塩液	50mL	点滴静注	側管	30分	○			○		○				
	○	アブラキサン	100mg/㎡	輸液ポンプ使用禁　インラインフィルター付きルート使用不可												
RP.7		生理食塩液	50mL	点滴静注	側管	全開	○			○		○				
RP.8		生理食塩液	250mL	点滴静注	メイン	60分	○									
	○	カルボプラチン	AUC:6													
RP.9		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	○									

CDDP+VP-16+Durvalumab triweekly

対象疾患	肺癌
投与間隔	3週1コース

催吐リスク	高度（催吐性）リスク

○レジメン内容（※制吐薬（下記参照）等の内服薬が処方される事があります。）

番号	抗癌剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	投与日									
							1	2	3	・・・	21					
RP.1		ソルデム3A	3000mL	点滴静注	メイン	指定なし	○									
				80mL/h インラインフィルター使用												
RP.2		ソルラクトD	500mL	点滴静注	側管	120分	○									
		デキサート	9.9mg													
RP.3		生理食塩液	50mL	点滴静注	側管	10分	○									
		パロノセトロン	0.75mg													
RP.4		生理食塩液	100mL	点滴静注	側管	30分	○									
	○	イミフィンジ		※30kg以下：20mg/kg ※30kg超え：1500mg/body												
RP.5		生理食塩液	500mL	点滴静注	側管	120分	○									
	○	シスプラチン	80mg/㎡													
RP.6		生理食塩液	500mL	点滴静注	側管	60分	○									
	○	エトポシド	100mg/㎡	PVCフリーの輸液セットを使用												
RP.7		ソルラクトD	500mL	点滴静注	側管	120分	○									
		プリンペラン	20mg													
RP.8		ソルラクトD	500mL	点滴静注	メイン	120分		○	○							
		プリンペラン	20mg													
		デキサート	3.3mg													
RP.9		生理食塩液	500mL	点滴静注	側管	60分		○	○							
	○	エトポシド	100mg/㎡	PVCフリーの輸液セットを使用												
RP.10		ソルラクトD	500mL	点滴静注	側管	120分		○	○							
		プリンペラン	20mg													

CBDCA+VP-16+Durvalumab triweekly

対象疾患	肺癌
投与間隔	3週1コース

催吐リスク	中等度(催吐性)リスク

○レジメン内容(※制吐薬(下記参照)等の内服薬が処方される事があります。)

番号	抗癌剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	投与日									
							1	2	3	・・・	21					
RP.1		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	30分	○									
				インラインフィルター使用												
RP.2		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分		○	○							
		デキサート	3.3mg													
RP.3		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	60分	○									
	○	イミフィンジ		※30kg以下：20mg/kg ※30kg超え：1500mg/body												
RP.4		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分	○									
		パロノセトロン	0.75mg													
		デキサート	3.3mg													
RP.5		5%ブドウ糖液	250mL	点滴静注	メイン	60分	○									
	○	カルボプラチン	AUC:5													
RP.6		生理食塩液	500mL	点滴静注	メイン	60分	○	○	○							
	○	エトポシド	100mg/㎡	PVCフリーの輸液セットを使用												
RP.7		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	○	○	○							

Durvalumab monthly

対象疾患	肺癌
投与間隔	4週1コース

催吐リスク	最小度（催吐性）リスク

○レジメン内容（※制吐薬（下記参照）等の内服薬が処方される事があります。）

番号	抗癌剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	投与日									
							1	2	3	・・・	28					
		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	30分	○									
RP.1				インラインフィルター使用												
		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	60分	○									
RP.2	○	イミフィンジ		※30kg以下：20mg/kg ※30kg超え：1500mg/body												
		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	○									
RP.3																

CBDCA+PEM+Osimertinib

対象疾患	非小細胞肺癌
投与間隔	3週1コース

催吐リスク	中等度(催吐性)リスク

〇レジメン内容(※制吐薬(下記参照)等の内服薬が処方される事があります。)

番号	抗癌剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	投与日									
							1									
RP.1		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分	〇									
		デキサート	3.3mg													
		パロノセトロン	0.75mg													
RP.2		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	10分	〇									
	〇	ペメトレキセド	500mg/㎡													
RP.3		5%ブドウ糖液	250mL	点滴静注	メイン	60分	〇									
	〇	カルボプラチン	AUC:5													
RP.4		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	〇									

2018.4　作成

PEM+Osimertinib(維持療法)

対象疾患	非小細胞肺癌
投与間隔	３週１コース

催吐リスク	軽度(催吐性)リスク

○レジメン内容(※制吐薬(下記参照)等の内服薬が処方される事があります。)

番号	抗癌剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	投与日									
							1									
RP.1		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分	○									
		デキサート	6.6mg													
RP.2		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	10分	○									
	○	ペメトレキセド	500mg/㎡													
RP.3		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	○									

2018.4　作成

CDDP+PEM+ニボルマブ＋イピリムマブ

対象疾患	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)
投与間隔	６週間1コース

催吐リスク	高度（催吐性）リスク

〇レジメン内容（※制吐薬（下記参照）等の内服薬が処方される事があります。）

番号	抗癌剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	投与日 1									
RP.1		ソルデム3A	3000mL	点滴静注	メイン		〇			〇						
RP.2		ソルラクトD	500mL	点滴静注	側管	120分	〇			〇						
		デキサート	9.9mg													
RP.3		生理食塩液	50mL	点滴静注	側管	10分	〇			〇						
		パロノセトロン	0.75mg													
RP.4		生理食塩液	100mL	点滴静注	側管	30分	〇			〇						
	〇	オプジーボ	360mg /body													
RP.5		生理食塩液	50mL	点滴静注	側管	30分	〇									
RP.6		生理食塩液	50mL	点滴静注	側管	30分	〇									
	〇	ヤーボイ	1mg/kg													
RP.7		生理食塩液	100mL	点滴静注	側管	10分	〇			〇						
	〇	ペメトレキセド	500mg/㎡													
RP.8		生理食塩液	100mL	点滴静注	側管	30分	〇			〇						
RP.9		生理食塩液	500mL	点滴静注	側管	120分	〇			〇						
	〇	シスプラチン	75mg/㎡													
RP.10		ソルラクトD	500mL	点滴静注	側管	120分	〇			〇						
RP.1		ソルラクトD	500mL	点滴静注	メイン	120分		〇			〇					
RP.2		ソルラクトD	500mL	点滴静注	メイン	120分		〇			〇					

2018.4　作成